

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZNIECZULENIE

Imię i Nazwisko Wiek

Data urodzenia Wzrost Waga

OPIS ZNIECZULENIA

1. **Znieczulenie ogólne dotchawicze:** jest to czasowe, kontrolowane i odwracalne zniesienie świadomości, odruchów bólowych i obronnych. Wykonują się je podając drogą dożylną lub wziewną (leki anestetyczne). Pacjent zostaje pozbawiony na czas operacji kontroli nad oddechem. Anestezjolog zabezpiecza oddech pacjenta poprzez założenie specjalnej rurki do jamy ustnej lub/i tchawicy. Wentylację zastępczą zabezpiecza respirator, który jest podstawowym wyposażeniem aparatu do znieczulenia. W czasie operacji podawane są dożylnie leki przeciwbólowe zmiotczające mięśnie oraz podtrzymujące sen farmakologiczny. Przez cały czas chory jest monitorowany za pomocą zapisu EKG, pomiaru ciśnienia krwi, saturacji czy parametrów wentylacji. Nad prawidłowym przebiegiem znieczulenia czuwa anestezjolog z pielęgniarką anestezjologiczną, Po zakończeniu operacji pacjent zostaje wybudzony i przekazany na salę pooperacyjną.
2. **Analgesodacja:** to czynność polegająca na podaniu leku uspokajającego lub/i przeciwbólowego drogą doustną/dożylną w celu zapewnienia pacjentowi uczucia komfortu przy wykonywaniu mniej bolesnych zabiegów leczniczych, operacyjnych w znieczuleniu miejscowym czy zabiegów diagnostycznych.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZNIECZULENIU

Każde znieczulenie może wiązać się z powikłaniami. Zwykle są to lekkie i przemijające dolegliwości m.in.: ból gardła, uczucie braku powietrza i przejściowe trudności w oddychaniu, nudności, wymioty, uszkodzenie warg, zęba, języka, alergia na leki anestetyczne, śródoperacyjne odzyskiwanie świadomości.

Ciężkie powikłania występują bardzo rzadko i są to m.in.: niedotlenienie organizmu związane z trudnościami podczas wentylacji, aspiracja treści żołądkowej do płuc, wstrząs, mnogi zator, zatrzymanie krążenia, gorączka złośliwa.

Przed wykonaniem znieczulenia należy powstrzymać się od posiłków przez minimum 6 godzin i płynów minimum 2 godziny (nie dotyczy niewielkiej ilości wody do poknięcia leków).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być przyczyną groźnych powikłań, włącznie ze skutkiem śmiertelnym. Na salę operacyjną chory udaje się w odzieży jednorazowej, bez makijażu, tipsów, pomalowanych paznokci, biżuterii czy protezy zębowej.

Powyższe zalecenia zrozumiałem/am i wyrażam świadomą zgodę na znieczulenie.

.....

Data i czytelny podpis Pacjenta

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

	POSTAW "X" WE WŁAŚCIWYM POLU LUB PODKREŚL	TAK	NIE
1	Przebyte znieczulenia		
2	Rodzaj znieczulenia: dotchawiczne, przewodowe, miejscowe		
3	Powikłania przy znieczuleniu		
4	Uczulenia na leki, jakie:		
5	Alergia na: pokarm, pyłki, katar sienny, środki chemiczne?		
6	Choroby płuc: astma, gruźlica, rozedma, zapalenie płuc-oskrzeli?		
7	Czy pali Pan/Pani papierosy? Ile sztuk na dobę?		
8	Czy ma Pan/Pani wysokie/niskie ciśnienie krwi?		
9	Czy choruję Pan/Pani na choroby serca? Choroba wieńcowa, przebyty zawał serca, zaburzenia rytmu serca?		
10	Czy ma Pan/Pani cukrzycę? Ewentualne leki:		
11	Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy?		
12	Choroby tarczycy: nadczynność, niedoczynność, wole?		
13	Choroby wątroby: WZW, marskość?		
14	Skłonność do siniaków, krwawień z nosa?		
15	Inne choroby:		
16	Przyjmowane leki:		

Badanie przedoperacyjne anestezjologiczne

BP..... HR..... ASA NYHA.....MALAMPATTI.....

.....

.....
 podpis anestezjologa i pieczętka